

Kirjallisesti vastattava kysymys E-001005/2024
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Aihe: SSRI- ja SNRI-lääkkeet ja niiden aiheuttamat PSSD-oireet

Mielenterveysongelmat yleistyvät hälyttävää vauhtia EU:ssa. Vaikka tietoisuus on lisääntynyt ja hoidon saatavuus parantunut, ilmi tulee myös yhä enemmän lääkkeiden mahdollisia sivuvaikutuksia.

Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) ja serotoniinin ja norepinefriinin takaisinoton estäjät (SNRI) ovat yleisimmät masennuslääkkeet. Näistä lääkkeitä on apua monille potilaille, mutta samalla niillä voi olla vakavia sivuvaikutuksia. Yksi näistä on SSRI-lääkityksen jälkeinen seksuaalinen toimintahäiriö (PSSD). Sen oireet alkavat yleensä serotoninergisten masennuslääkkeiden käytön lopettamisen jälkeen. Oireita voivat olla genitaalialueen tunnottomuus, erektiohäiriöt ja orgasmi- tai ejakulaatiovaikeudet. Myös muut kuin seksuaaliset oireet ovat mahdollisia, kuten kyvyttömyys tuntea nautintoa ja välinpitämättömyys.

Koska SSRI- ja SNRI-lääkkeitä määrätään myös hyvin nuorille potilaille, on tärkeää olla tietoinen niiden sivuvaikutuksista ja ehkäistä niitä aktiivisesti.

1. Onko komissio tietoinen PSSD-oireiden lisääntymisestä ja niiden pitkäaikaisista vaikutuksista tiettyihin potilaisiin?
2. Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä parantaakseen SSRI- ja SNRI-lääkkeiden tutkimusta PSSD-oireiden ehkäisemiseksi?
3. Miten komissio aikoo tehdä yhteistyötä Euroopan lääkeviraston kanssa varmistaakseen, että lääkärit ja potilaat ovat paremmin tietoisia PSSD-oireiden riskistä, ja varmistaakseen, että Euroopan lääkevirasto ryhtyy toimiin SSRI- ja SNRI-lääkkeitä koskevien lääkkeiden haittavaikutuksista tehtyjen ilmoitusten perusteella?

Jätetty:3.4.2024